

٢٨٥٤

إدارة الامتحانات والاختبارات  
قسم الامتحانات العامة

## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤

(وثيقة محمية/محدود)

٣ : ٢

مدة الامتحان:

رقم المبحث: 216

المبحث: الرياضيات (الورقة الثانية، ف٢)

اليوم والتاريخ: الثلاثاء ٢٠٢٤/٧/٢ م

رقم النموذج: (١)

الفرع: (أدبي، شرعي، فندقي جامعات)

رقم الجلوس:

اسم الطالب:

ملحوظة مهمة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (5) بحيث تكون إجابتك عن السؤال الأول على نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي)، وتكون إجابتك عن باقي الأسئلة على دفتر الإجابة، علماً أن عدد صفحات الامتحان (6).

المسألة الأولى: (100 علامة)

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك في هذا السؤال، علماً بأن عدد فقراته (25)، وانتبه عند تظليل إجابتك أن رمز الإجابة (a) على ورقة الأسئلة يقابله (أ) على ورقة القارئ الضوئي و (b) يقابله (ب)، و (c) يقابله (ج)، و (d) يقابله (د).

(1) إذا كان  $f(x) = \frac{3}{x-2}$ ، فإن أي اقتران أصلي للاقتران  $f(x)$  يُكتب على الصورة:

- a)  $G(x) = x^{-3} + C$
- b)  $G(x) = 3x^3 + C$
- c)  $G(x) = x^3 + C$
- d)  $G(x) = 3x^{-3} + C$

(2)  $\int (3x-1)(3x+1)dx$  هو:


- a)  $3x^3 - x + C$
- b)  $9x^3 + x + C$
- c)  $9x^3 - x + C$
- d)  $3x^3 + x + C$

(3) إذا كان  $\int (px^2 + 7) dx = -6x^3 + 7x + C$ ، فإن قيمة الثابت  $p$  هي:

- a) 18
- b) 6
- c) -6
- d) -18

(4) يُبين الشكل الآتي منحنى الاقتران  $f(x)$ ، حيث  $f'(x) = 4 - 6x^2$ ، فما قاعدة الاقتران  $f(x)$  ؟

- a)  $f(x) = -6x^3 + 4x - 1$
- b)  $f(x) = -2x^3 + 4x + 1$
- c)  $f(x) = -6x^3 + 4x + 2$
- d)  $f(x) = -2x^3 + 4x - 2$



يتبع الصفحة الثانية ....

(5) إذا كان ميل المماس لمنحنى العلاقة  $y$  هو  $\frac{dy}{dx} = 5 - 8x^2$  ، فإن قاعدة العلاقة  $y$  التي يمر منحنىها

بالنقطة  $(1, 7)$  هي:

a)  $y = 5x - 2x^4 + 4$

b)  $y = 5x - 2x^4 - 4$

c)  $y = 5x - 2x^4 - 7$

d)  $y = 5x - 2x^4 + 7$

• إذا كان  $\int_1^5 f(x)dx = 3$  ،  $\int_4^5 f(x)dx = 4$  ،  $\int_1^5 g(x)dx = -2$  ، فأجب عن الفقرتين 6 و 7 الآتيتين:

(6) قيمة  $\int_1^5 (3f(x) + g(x))dx$  هي:

a) 1

b) 9

c) 5

d) 7

(7) قيمة  $\int_1^4 f(x)dx - \int_4^4 (g(x) + 1)dx$  هي:

a) -2

b) -1

c) 1

d) 2

(8) إذا كان  $\int_0^3 (a - 1)dx = 21$  ، فإن قيمة الثابت  $a$  تساوي:

a) 7

b) 9

c) 6

d) 8


(9) التكامل المحدود الذي قيمته تساوي مساحة المنطقة المظللة في التمثيل البياني الآتي هو:

a)  $\int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^2 f(x)dx$

b)  $-\int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^2 f(x)dx$

c)  $-\int_{-1}^0 f(x)dx - \int_0^2 f(x)dx$

d)  $\int_{-1}^0 f(x)dx - \int_0^2 f(x)dx$



(10) إذا كانت المساحة المحصورة بين منحنى الاقتران  $f(x) = 3x^2$  ، والمحور  $x$  والمستقيمين  $x = k$  ،  $x = 1$  ،

حيث  $k > 1$  تساوي 7 وحدات مربعة ، فإن قيمة الثابت  $k$  تساوي:

a) 8

b) 7

c) 3

d) 2



(11)  $\int 6 \cos(3x - 1) dx$  هو:

- a)  $2 \sin(3x - 1) + C$
- b)  $-2 \sin(3x - 1) + C$
- c)  $6 \sin(3x - 1) + C$
- d)  $-6 \sin(3x - 1) + C$

الف. صحه 284

(12) قيمة  $\int_0^1 \frac{e^x + 1}{e^x + x} dx$  هي:

- a)  $e - 1$
- b)  $\ln(e + 1)$
- c)  $\ln e$
- d)  $e + 1$

(13)  $\int (x^2 - 4x + 4)^5 dx$  هو:

- a)  $\frac{(x-2)^6}{6} + C$
- b)  $\frac{(x-2)^2}{2} + C$
- c)  $\frac{(x-2)^{11}}{11} + C$
- d)  $\frac{(x-2)^3}{3} + C$

(14)  $\int \sqrt{e^{3x}} dx$  هو:

- a)  $\frac{3}{2} e^{\frac{3}{2}x} + C$
- b)  $\frac{1}{3} e^{\frac{3}{2}x} + C$
- c)  $\frac{2}{3} e^{\frac{3}{2}x} + C$
- d)  $3e^{\frac{3}{2}x} + C$

(15)  $\int \frac{\ln(x+1)}{x+1} dx$  هو:

- a)  $\ln(x + 1) + C$
- b)  $\frac{1}{2} (\ln(x + 1))^2 + C$
- c)  $\frac{2}{(x+1)^2} + C$
- d)  $\frac{-2}{(x+1)^2} + C$

(16) إذا كان  $X \sim \text{Geo}(0.8)$ ، فإن  $P(X = 2)$  هو:

- a) 0.32
- b) 0.16
- c) 0.04
- d) 0.20

17) إذا كان  $X \sim Geo(p)$  ، وكان  $P(X < 2) = 0.2$  ، فإن التوقع  $E(X)$  هو:

- a) 2
- b) 4
- c) 5
- d) 10

٢٠٥٤

18) التجربة العشوائية التي تمثل تجربة احتمالية ذات ختتين متا ياتي هي:

- a) إلقاء 5 قطع نقدية منتظمة، والتوقف عند ظهور الصورة لأول مرة على جميع القطع.
- b) رمي حجر نرد منتظم، والتوقف عند ظهور العدد 3 .
- c) رمي كرة سلة نحو الهدف 10 مرات، وتسجيل عدد مرات إصابة الهدف.
- d) تدوير مؤشر قرص دائري ينقسم إلى 3 قطاعات متطابقة وملونة بإحدى الألوان الأحمر أو الأزرق أو الأصفر، ثم التوقف عند استقرار رأس المؤشر على اللون الأزرق.

19) إذا كان  $X \sim B(n, p)$  ، وكان  $E(X) = 240$  ،  $Var(X) = 48$  ، فإن قيمة  $p$  هي:

- a) 0.8
- b) 0.6
- c) 0.4
- d) 0.2

20) يعتمد شكل المنحنى الطبيعي وموقعه على الوسط الحسابي والانحراف المعياري. إذا زاد الوسط الحسابي

من 0 إلى 4 مع ثبات قيمة الانحراف المعياري، فإن ذلك يؤدي إلى:

- a) عدم تأثر مركز البيانات.
- b) توسع المنحنى أفقياً.
- c) انسحاب المنحنى إلى اليمين 4 وحدات.
- d) انسحاب المنحنى إلى اليسار 4 وحدات.

21) إذا كان  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  ، وكان  $P(\mu < X < \mu + 2\sigma) = 0.475$  ، فإن  $P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma)$  يساوي:

- a) 0.64
- b) 0.815
- c) 0.975
- d) 0.95

22) إذا كان  $Z \sim N(0, 1)$  ، وكان  $P(Z > -2.01) = 0.9778$  ، فإن  $P(Z < 2.01)$  يساوي:

- a) 0.222
- b) 0.4778
- c) 0.5000
- d) 0.9778

23) إذا كان  $Z \sim N(0, 1)$  ، وكان  $P(0 < Z < a) = 0.35$  ، فإن  $P(Z < a)$  يساوي:

- a) 0.85
- b) 0.65
- c) 0.15
- d) 0.35



الصفحة الخامسة/ نموذج (١)

(24) إذا كان  $X \sim N(24, 100)$ ، فإن القيمة المعيارية  $z$  التي تقابل  $x = 20$  هي:

- a) 0.4
- b) -0.4
- c) 0.04
- d) -0.04

٢٠

(25) يمثل المتغير العشوائي  $X$  كُتل 5000 ثمرة من ثمار البرتقال (بالغرام)، حيث  $X \sim N(75, 4)$ . إذا علمت أن  $P(Z < 1) = 0.8413$ ،  $P(Z < 2) = 0.9772$ ، فما عدد ثمار البرتقال التي تريد كُتلة كل منها على 79 g ؟

- a) 114
- b) 793
- c) 4205
- d) 4886

عزيزي الطالب: أجب عن الأسئلة (الثاني والثالث والرابع والخامس) على دفتر إجابتك فهو المعتمد فقط لاحتساب علامتك في هذه الأسئلة.

السؤال الثاني: (22 علامة):

(a) يُمثل الاقتران  $C'(x) = 3x^2 - 2x$  التكلفة الحدية (بالدينار) لكل قطعة تُنتج في إحدى الشركات، حيث  $x$  عدد القطع المنتجة، و  $C(x)$  تكلفة إنتاج  $x$  قطعة بالدينار. جد اقتران التكلفة  $C(x)$  علماً بأن تكلفة إنتاج 3 قطع هي JD 418.

(b) إذا كان  $f(x) = |3 - x| + 2$ ، فجد  $\int_0^4 f(x) dx$ .

(c) جد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران  $f(x) = x^3 + 4x$  والمحور  $x$  والمستقيمين  $x = -1$ ،  $x = -2$ .

السؤال الثالث: (28 علامة):

(a) جد كلا من التكاملات الآتية:

1)  $\int \left( \frac{\cos x}{6 + \sin x} + \frac{9}{x^2} \right) dx$

2)  $\int \left( \frac{2x^4 - 3x^6}{x^4} + \ln 4 \right) dx$

3)  $\int_0^2 (x^2 + 1)e^{x^2 + 3x} dx$

الصفحة السادسة/ نموذج (١)

السؤال الرابع: (20 علامة):

(a) قرر لاعب زمني السهام على لوحة الهدف، بحيث يتوقف عند إصابته الهدف أول مرة. إذا كان احتمال إصابته للهدف في كل مرة هو  $\frac{1}{3}$ ، فأجب عن كل مما يأتي:

(10 علامات)

(1) ما احتمال أن يصيب الهدف لأول مرة في المحاولة الخامسة؟

(2) كم سهمًا يتوقع أن يطلق اللاعب حتى يصيب الهدف أول مرة؟


(b) وفقًا لنموذج تقييم الخدمة الإلكتروني في إحدى الشركات، تبين رضا 80% من الزبائن عن خدمات الشركة. إذا

قدمت الشركة خدماتها لـ 12 زبونًا في أحد الأيام، ما احتمال رضا 3 زبائن على الأقل عن خدمات الشركة؟

(10 علامات)

السؤال الخامس: (30 علامة):

(a) إذا كان  $X \sim N(84, 4^2)$ ، فاستعمل القاعدة التجريبية والشكل المجاور الذي يُمثل منحنى توزيعًا طبيعيًا للإجابة عن كل مما يأتي:



(1) ما قيمة  $P(80 < X < 92)$  ؟

(2) ما النسبة المئوية للبيانات التي تقل عن الوسط الحسابي بمقدار لا يزيد على انحرافين معياريين؟

(b) يُمثل المتغير العشوائي  $X$  أطوال 1000 طالب في إحدى المدارس الثانوية (بالسنتيمتر)، حيث  $X \sim N(165, 25)$ ، فأجب عن كل مما يأتي:

(18 علامة)

(1) ما نسبة الطلبة الذين تقل أطوالهم عن 157 cm ؟

(2) إذا قررت إدارة المدرسة اختيار 15 طالبًا من ذوي الأطوال الأعلى للمشاركة في إحدى الألعاب الرياضية،

فما أقل طول للطلبة الذين وقع الاختيار عليهم؟

ملاحظة: يمكنك الاستفادة من الجدول الآتي الذي يتضمن قيمًا مأخوذة من جدول التوزيع الطبيعي المعياري.

$z$	0.60	1.17	1.60	2.17	2.60
$P(Z < z)$	0.7257	0.8790	0.9452	0.9850	0.9953

« انتهت الأسئلة »



السؤال الثاني :

280 E.P

$$C(x) = \int C'(x) dx$$

(8)

$$= \int 3x^2 - 2x dx$$

$$= x^3 - x^2 + C$$

$$C(3) = 27 - 9 + C = 418$$

$$18 + C = 418$$

$$C = 400$$

$$\therefore C(x) = x^3 - x^2 + 400$$

$$3 - x = 0$$

$$\boxed{x=3}$$

(b)

$$\begin{array}{r} 3-x+2 \quad x-3+2 \\ \hline 0 \quad 3 \quad 4 \\ 5-x \quad x-1 \\ \hline 0 \quad 3 \quad 4 \end{array}$$

$$\int_0^3 5-x dx + \int_3^4 x-2 dx$$

$$= 5x - \frac{x^2}{2} \Big|_0^3 + \frac{x^2}{2} - 2x \Big|_3^4$$

$$= (15 - \frac{9}{2}) - (0) + (\frac{16}{2} - 8) - (\frac{9}{2} - 6)$$

$$= 15 - \frac{18}{2} + 6$$

$$= 15 - 9 + 6 = 12$$

للان

منصة سين التعليمية



200.ع.پ


$$x^3 + 4x = 0$$

(C)

$$x(x^2 + 4) = 0$$

$$x = 0 \quad x^2 + 4 = 0$$

$$x = \pm 2i$$



$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^{-1} -x^3 - 4x \, dx = \left[ -\frac{x^4}{4} - \frac{4x^2}{2} \right]_{-2}^{-1} \\ &= \left( -\frac{1}{4} - 2 \right) - (-4 - 8) \\ &= -\frac{9}{4} - (-12) \\ &= -\frac{9}{4} + 12 = \frac{39}{4} \end{aligned}$$

السؤال الثالث

$$(1) \ln |6 + \sin x| \rightarrow \frac{a}{x} + c$$

$$(2) \int \frac{2x^4}{x^4} - \frac{3x^6}{x^4} + \ln 4 \, dx$$

$$\int 2 - 3x^2 + \ln 4 \, dx = 2x - x^3 + (\ln 4)x + c$$

$$(3) y = x^3 + 3x \quad 2x = \frac{dy}{3x^2 + 3}$$

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 3$$

$$\frac{1}{3} e^{x^3 + 3x} \Big|_0^2 = \frac{1}{3} e^4 - \frac{1}{3}$$

$$\int \frac{(x^2 + 1)e^y}{3x^2 + 3} \frac{dy}{dx} = \int \frac{1}{3} e^y \, dy$$

www.1000maths.com

مادة سين التفاضل



المسألة ٤.٢

السؤال ١: اوجد

(b)  $S(t) = \int \sqrt{4+t^2} dt$

$$= \int -5t(4+t^2)^{-\frac{3}{2}} dt$$

$$y = 4+t^2 \quad \int -5t(y)^{-\frac{3}{2}} \frac{dy}{2t}$$

$$\frac{dy}{dt} = 2t$$

$$\int \frac{5}{2} \cdot \frac{2}{-1} y^{-\frac{1}{2}} + C$$

$$S(t) = \frac{5}{\sqrt{y}} + C$$

$$= \frac{5}{\sqrt{4+t^2}} + C$$

$S(0) = 3$

$$S(0) = \frac{5}{2} + C = 3$$

$$C = 3 - \frac{5}{2}$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$\therefore S(t) = \frac{5}{\sqrt{4+t^2}} + \frac{1}{2}$$



وزارة التعليم  
Ministry of Education



السؤال احس ا ب :

(a)

$$p = \frac{1}{3}, \quad 1 - p = \frac{2}{3}$$

$$P(5) = \binom{4}{5} \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^4$$
$$= \frac{16}{243}$$

(2)

$$E(x) = \frac{1}{p} = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3$$

$$1 - p = 0.2$$

$$p = \frac{80}{100} = 0.8, \quad n = 12$$

(b)

$$P(X > 3) = 1 - P(X < 3)$$

$$= 1 - (P(0) + P(1) + P(2))$$

$$= 1 - \left( \binom{12}{0} (0.8)^0 (0.2)^{12} + \binom{12}{1} (0.8)^1 (0.2)^{11} + \binom{12}{2} (0.8)^2 (0.2)^{10} \right)$$

$$= 0.999$$



السؤال (الخاصة)

2.4

$$P(80 < X < 92)$$

(a)

(1)

$$P(\mu - \sigma < X < \mu + 2\sigma)$$

$$34\% + 34\% + 13.5\%$$

$$= 81.5\%$$

$$34\% + 13.5\% = 47.5\% \quad (2)$$

$$P(X < 157)$$

(1) (b)

$$P(Z < \frac{157 - 165}{5})$$

$$P(Z < -1.6)$$

$$\begin{aligned} P(Z > 1.6) &= 1 - P(Z < 1.6) \\ &= 1 - 0.9452 \\ &= 0.0548 \end{aligned}$$

$$القيمة X (المتوسط) = 165$$

(2)

$$P(X > a) = \frac{15}{1000}$$

$$+ P(Z < \frac{a - 165}{5}) = 0.985$$

$$P(X > a) = 0.015$$

$$\frac{a - 165}{5} = 2.17$$

$$P(Z > \frac{a - 165}{5}) = 0.015$$

$$a - 165 = 10.85$$

$$X - P(Z < \frac{a - 165}{5}) = 0.015$$

$$\boxed{a = 175.85}$$